

**Exercices résolus de mathématiques.**

# Analyse

**ANA 36**

**EXANA360 – EXANA369**

<http://www.matheux.c.la>

**Jacques Collot  
Benoit Baudalet – Steve Tumson  
Nicole Berckmans – Jan Frans Broeck  
Fabienne Zoetard**

Septembre 2013

## EXANA360 – EPL, UCL, LLN, septembre 2013.

1) Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$$

2) Calculer une primitive de la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \frac{2 + 3x + x^2}{x(x^2 + 1)}$$

3) Démontrer que l'équation

$$x^2 = 2^x$$

admet une solution dans l'intervalle  $[-1, 0]$

4) Calculer l'aire de la surface comprise entre la droite  $y = x - 1$  et la parabole  $y^2 = 2x + 6$

---

### Solution proposée par Louis François

$$1) \forall x \neq 0, -1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} -|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x| \\ \lim_{x \rightarrow 0} -|x| = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Théorème de l'étau}} \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \text{ car on se ramène au résultat précédent en posant } X = \frac{1}{x} \text{ et } x \rightarrow \infty \Leftrightarrow X \rightarrow 0$$

$$2) \frac{2 + 3x + x^2}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + c}{x^2 + 1} = \frac{A + Cx + (A + B)x^2}{x(x^2 + 1)} \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ C = 3 \\ B = -1 \end{cases}$$

$$\int f(x) dx = \int \left( \frac{2}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} + \frac{3}{x^2 + 1} \right) dx = \int \left( \frac{2}{x} - \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{3}{x^2 + 1} \right) dx$$
$$= 2 \ln|x| - \ln \sqrt{x^2 + 1} + 3 \arctan x + K$$

$$3) \text{ Soit } f(x) = x^2 - 2^x \quad \begin{cases} f \text{ continue} \\ f(-1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0 \\ f(0) = -1 < 0 \end{cases}$$

$f$  admet donc une racine (au moins) sur  $[-1, 0]$  par le théorème des valeurs intermédiaires.



$$4) \begin{cases} y = x - 1 \\ y^2 = 2x + 6 \end{cases} \Rightarrow (x-1)^2 = 2x+6 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = 2 \pm 3 \Rightarrow \begin{cases} (5, 4) \\ (-1, -2) \end{cases}$$

En intégrant avec y comme variable :

$$\begin{cases} \text{Droite : } x = y + 1 \\ \text{Parabole : } x = \frac{y^2 - 6}{2} \end{cases} \Rightarrow \text{Aire : } A = \int_{-2}^4 \left( y + 1 - \frac{y^2 - 6}{2} \right) dy = \frac{1}{2} \int_{-2}^4 (-y^2 + 2y + 8) dy$$

$$= \frac{1}{2} \left[ -\frac{y^3}{3} + y^2 + 8y \right]_{-2}^4 = 18$$

En intégrant avec x comme variable :

$$A = \int_{-3}^5 \sqrt{2x+6} dx + \int_{-3}^{-1} \sqrt{2x+6} dx + \text{Aire } \Delta T_1 - \text{Aire } \Delta T_2$$

$$= \frac{64}{3} + \frac{8}{3} + 2 - 8 = 18$$

ou

$$A = \int_{-3}^{-1} 2\sqrt{2x+6} dx + \int_{-1}^5 (\sqrt{2x+6} - (x-1)) dx$$

$$= \left[ \frac{2(2x+6)^{3/2}}{3} \right] + \left[ \frac{2(2x+6)^{3/2}}{3} - \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^5 = \frac{2}{3} \times 8 + \frac{64}{3} - \frac{25}{2} + 5 + \frac{1}{2} + 1 - \frac{8}{3} = 18$$

13 septembre 2013

## EXANA361 – EPL, UCL, LLN, septembre 2013.

Soit la fonction  $f$  définie par

$$f(x) = x(\ln x)^2$$

1. Calculer la dérivée  $f'$  de  $f$ .
2. Déterminer le signe de  $f'$ .
3. Etudier le signe de  $f'$ .
4. Déterminer  $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln u}{\sqrt{u}}$  puis  $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{(\ln u)^2}{u}$
5. En déduire  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x)^2$  et conclure sur l'existence d'un prolongement continue de  $f$  en 0.  $\tilde{f}(0) = ?$
6. Etudier la dérivabilité de  $\tilde{f}$  en 0 à droite et donner les conclusions graphiques.
7. Donner le tableau des variations de  $f$ . ( $f'$  et  $f''$ )
8. Dessiner le graphe de la fonction  $f$ .

---

### Solution proposée par Louis François

1 et 2)  $f'(x) = \ln(\ln x + 2)$  s'annule en  $x = 1$  et  $x = 1/e^2$

$x$	0	$1/e^2$	1	
$f'(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	$\nearrow$	max	$\searrow$	min

$$4) \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln u}{\sqrt{u}} \xrightarrow{H} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{u}}{u} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{u}} = 0$$

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 u}{u} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln u}{\sqrt{u}} \right)^2 = \left( \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln u}{\sqrt{u}} \right)^2 = 0$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} x(\ln x)^2 \stackrel{u=1/x}{=} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{(-\ln u)^2}{u} = 0$$


Donc  $f$  admet un prolongement continu  $\tilde{f}(x)$  en  $x = 0$  et  $\tilde{f}(0) = 0$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\ln x)^2}{x} = +\infty$$

La tangente en  $(0,0)$  est verticale et donc la prolongée  $\tilde{f}(x)$  est non dérivable en  $x = 0$

$$7) f''(x) = \frac{2(\ln x + 1)}{x} \text{ s'annule en } x = 1/e$$

Point d'inflexion en  $\left(\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$ ; Max local en  $\left(\frac{1}{e^2}, \frac{4}{e^2}\right)$ ; Min en  $(0,0)$  et  $(1,0)$



13 septembre 2013

## EXANA362 – EPL, UCL, LLN, septembre 2013.

Un cycliste effectue une épreuve en solitaire sur un parcours tout-à-fait à plat mais soumis à un vent tournoyant. La vitesse du vent dans la direction du cycliste peut être modélisée par une fonction du temps donnée par

$$f(t) = 40 \cos(\alpha t) \quad [\text{km/h}]$$

où  $\alpha$  est un paramètre constant. On suppose que le cycliste démarre son parcours au temps  $t = 0$ .

Pour simplifier l'effet du vent sur le cycliste, on modélise la vitesse de celui-ci par une constante  $v_0$  (correspondant à sa vitesse en l'absence de vent) plus un quart de la vitesse du vent dans sa direction. On s'intéresse au temps que mettra le cycliste pour terminer son parcours d'une longueur  $K = 40$  km. On suppose que  $v_0 > 20$  km/h

1. Calculer l'expression de la vitesse  $v(t)$  du cycliste en fonction du temps, puis la distance  $d(t)$  parcourue par le cycliste en fonction du temps.
2. Ecrire l'équation que satisfait la durée totale  $t_T$  mise par le cycliste pour terminer son parcours. Démontrer que cette équation admet une et une seule solution.
3. Pour  $a = 120\pi$  et  $v_0 = 40$  km/h donner la solution  $t_T$ .

---

### Solution proposée par Louis François

1)  $v(t) = v_0 + 10 \cos at > 0$  car  $v_0 > 20$  et  $-10 \leq 10 \cos at \leq 10$


$$d(t) = \int v(t) dt = v_0 t + \frac{10}{a} \sin at + k \quad \text{or} \quad d(0) = 0 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow d(t) = v_0 t + \frac{10}{a} \sin at$$

2) Equation à résoudre :  $v_0 t + \frac{10}{a} \sin at = 40$

$$\left. \begin{array}{l} d(0) = 0 \\ d \text{ strictement croissante car } d' = v > 0 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} d(t) = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Cette équation admet une et une seule racine.}$$

3)  $40t + \frac{1}{12\pi} \sin 120\pi t = 40$ . Il faut une heure pour faire 40 km. Remarquons que la période

de la vitesse est de  $\frac{1}{60} = 1$  minute  $\Rightarrow t = 1$  h. Racine unique



---

13 septembre 2013

# EXANA363 – POLYTECH, Umons, Mons, juillet 2012.

Etudiez la fonction

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^2}} \quad (a > 0)$$

et faites en une représentation graphique soignée.

**Solution proposée par Fabienne Zoetard.**

1.  $CE : x^2 \neq a^2 \Rightarrow x \neq \pm a \Rightarrow \text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{\pm a\}$

2. Remarquons que  $\forall x \in \text{dom } f :$

a)  $y(-x) = y(x)$  La fonction est paire et son graphique admet donc  $Oy$  comme axe de symétrie.

b)  $y(x) > 0$  La fonction est strictement positive et son graphique est donc au-dessus de l'axe  $Ox$ .

$$c) y(x) = \begin{cases} \frac{1}{a^2 - x^2} & \text{si } a^2 - x^2 > 0 \text{ donc si } -a < x < a \\ -\frac{1}{a^2 - x^2} & \text{si } a^2 - x^2 < 0 \text{ donc si } x < -a \text{ ou } x > a \end{cases}$$

3.  $AV : \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^2}} = +\infty \Rightarrow \begin{cases} AV_1 \equiv x = a \\ AV_2 \equiv x = -a \end{cases}$

$AH : \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^2}} = 0 \Rightarrow AH \equiv y = 0$  en  $+\infty$  et  $-\infty$  et le graphique est au-dessus de  $Ox$

4. a) Si  $-a < x < a$  :  $y'(x) = \left( \frac{1}{a^2 - x^2} \right)' = \frac{2x}{(a^2 - x^2)^2}$

Si  $x < -a$  ou  $x > a$  :  $y'(x) = \left( -\frac{1}{a^2 - x^2} \right)' = -\frac{2x}{(a^2 - x^2)^2}$

$x$	$-a$	$0$	$a$
$y'$	+	/	-


b) Si  $-a < x < a$  :  $y''(x) = \left( \frac{2x}{(a^2 - x^2)^2} \right)' = 2 \frac{3x^2 + a^2}{(a^2 - x^2)^3}$

Si  $x < -a$  ou  $x > a$  :  $y''(x) = \left( -\frac{2x}{(a^2 - x^2)^2} \right)' = -2 \frac{3x^2 + a^2}{(a^2 - x^2)^3}$

$x$	$-a$	$a$
$y''$	+	/

Tableau de variations


$x$	$-\infty$		$-a$		$0$		$+a$		$+\infty$	
$y'$	+	+	/	-	0	+	/	-	-	
$y''$	+	+	/	+	+	+	/	+	+	
$y$	$AH \equiv y = 0$		$\nearrow$	$AV \equiv x = -a$	$\searrow$	min	$\nearrow$	$AV \equiv x = a$	$\searrow$	$AH \equiv y = 0$
			∪		∪	∪		∪		



Remarque : Le graphique peut aussi être construit en constatant que  $y(x)$  est l'inverse de

du graphe de  $f(x) = |a^2 - x^2| = \begin{cases} a^2 - x^2 & \text{si } a^2 - x^2 > 0 \\ -(a^2 - x^2) & \text{si } a^2 - x^2 < 0 \end{cases}$  avec  $x \neq a$ .

On utilisera les principes acquis en début de 5<sup>ème</sup> dans le chap "Opérations sur les fonctions".



## EXANA364 – POLYTECH, Umons, Mons, juillet 2012.

Étudiez la fonction

$$f(x) = \frac{3}{4}x^4 + x^3 - 3x^2$$

et faites-en une représentation graphique soignée.

Utilisez l'analyse précédente pour étudier l'existence et le signe des racines de l'équation:

$$\frac{3}{4}x^4 + x^3 - 3x^2 - m = 0$$

où  $m$  est un paramètre qui peut prendre n'importe quelle valeur réelle.

**Solution proposée par Fabienne Zoetard.**

1.  $\text{Dom } f = \mathbb{R}$
2. Aucune particularité (parité, signe,...), ni asymptote (pas d'AV car  $\text{dom } f = \mathbb{R}$ , pas d'A-nonV car la fonction est de degré 4)
3.  $f'(x) = 3x(x-1)(x+2)$


$x$	-2	0	1	
$(x-1)(x-2)$	+ 0	- -	- 0	+
$x$	-	-	0	+ + +
$f'(x)$	- 0	+ 0	- 0	+

4.  $f''(x) = 3(3x^2 + 2x - 2)$     Racines :  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{3}$

$x$	$\frac{-1-\sqrt{7}}{3}$	$\frac{-1+\sqrt{7}}{3}$	
$f''$	+ 0	- 0	+


5. Tableau des variations

	-2	$\frac{-1-\sqrt{7}}{3}$	0	$\frac{-1+\sqrt{7}}{3}$	1	
$f'(x)$	- 0	+ +	+ 0	- -	- 0	+
$f''(x)$	+ +	+ 0	- -	- 0	+ +	+
$f(x)$	↘ min ↗	↗ ↗ ↗	max ↘	↘ ↘ ↘	min ↗	↗
	∪ (-2, -8) ∪	$I_1$	∩ (0,0) ∩	$I_2$	∪ (1, -5/4) ∪	



Les solutions de l'équation  $\frac{3}{4}x^4 + x^3 - 3x^2 - m = 0$  sont les abscisses des points d'intersection du graphe de  $f$  et de la droite d'équation  $y = m$  ( $m \in \mathbb{R}$ )

$m$	Nombre de solutions	Signe des solutions
$m > 0$	2	1: +, 1: -
$m = 0$	3	1: +, 1: 0, 1: -
$-\frac{5}{4} < m < 0$	4	2: +, 2: -
$m = -\frac{5}{4}$	3	1: +, 2: -
$-8 < m < -\frac{5}{4}$	2	2: -
$m = -8$	1	1: -
$m < -8$	Pas de solution	



## EXANA365 – POLYTECH, Umons, Mons, juillet 2013.

Calculer la primitive de

$$\int \frac{x}{1 + \cos x} dx$$

en posant  $y = \frac{x}{2}$

---

**Solution proposée par Fabienne Zoetard.**

$$P = \int \frac{x}{1 + \cos x} dx = \int \frac{x}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \stackrel{y=\frac{x}{2}}{=} 2 \int \frac{y}{\cos^2 y} dy$$

Par parties:

$$\begin{cases} f = y & f' = 1 \\ g' = \frac{1}{\cos^2 y} & g = \tan y \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = 2 \left( y \tan y - \int \tan y dy \right) = 2 \left( y \tan y - \ln |\cos y| \right)$$

$$= x \tan \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| = x \tan \frac{x}{2} + \ln \cos^2 \frac{x}{2} + C$$

Vérification :


$$\begin{aligned} \left( x \tan \frac{x}{2} + \ln \cos^2 \frac{x}{2} \right)' &= \tan \frac{x}{2} + x \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \left( -\sin \frac{x}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \tan \frac{x}{2} + \frac{x - 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + x - 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{x}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

---

27 octobre 2013

## EXANA366 – POLYTECH, Umons, Mons, juillet 2013.

Considérons une fonction parabolique dont le coefficient multipliant  $x^2$  est une fonction linéaire du temps  $t$ . La parabole est donnée par la fonction  $p(x) = tx^2$ . Considérons également une droite  $d(x)$  passant par le centre du repère et dont l'angle  $\alpha$  (voir figure ci-dessous) est aussi une fonction linéaire du temps :  $\alpha = t$ . Soit  $S_1$ , la surface délimitée par  $p(x)$  et  $d(x)$ . On demande de déterminer l'évolution au cours du temps du rapport entre  $S_1$  et la surface du triangle  $ABC$  (voir figure)



Si on travaille dans un repère orthonormé, alors  $\tan(t)$  est la pente de la droite  $d(x)$ . ( $-90^\circ < t < +90^\circ$ ). La droite  $d(x)$  a pour équation :  $d(x) = \tan(t).x$ .

Cherchons les intersections de la parabole et de la droite.

$$\begin{cases} p(x) = t.x^2 \\ d(x) = \tan(t).x \end{cases} \Rightarrow tx^2 - \tan(t).x = 0 \Rightarrow \begin{cases} A : (0,0) \\ B : \left( \frac{\tan(t)}{t}, \frac{\tan^2(t)}{t} \right) \end{cases}$$


La surface  $S_1$  est donnée par :

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^{\frac{\tan(t)}{t}} (d(x) - p(x)).dx = \int_0^{\frac{\tan(t)}{t}} (\tan(t).x - t.x^2).dx \\ &= \left[ \tan(t) \frac{x^2}{2} - t \frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{\tan(t)}{t}} = \frac{1}{6} \frac{\tan^3(t)}{t^2} \end{aligned}$$

La surface  $S_2$  du triangle  $ABC$  est  $S_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\tan(t)}{t} \cdot \frac{\tan^2(t)}{t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\tan^3(t)}{t^2}$

$$\text{Et donc } \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{1}{6} \frac{\tan^3(t)}{t^2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\tan^3(t)}{t^2}} = \frac{1}{3}.$$

Autrement dit ce rapport est constant et indépendant du temps



---

27 octobre 2013


## EXANA367 – POLYTECH, Umons, Mons, juillet 2013.

La pièce métallique à fabriquer est le volume engendré par la rotation autour de l'axe  $Oy$  de l'aire comprise entre les courbes  $y = x^2$  et  $y = \left(x + \frac{1}{4}\right)^2$  pour  $x \geq 0$  et  $y \leq 4$ .

1. Représentez graphiquement l'aire en question.
2. Calculez le volume de métal nécessaire pour fabriquer la pièce.

---

Solution proposée par Fabienne Zoetard.



Transformons les fonctions, les ordonnées étant considérées comme positives:

$$\begin{cases} y = x^2 & \Rightarrow x = \sqrt{y} & \Rightarrow f(x) = \sqrt{y} \\ y = \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 & \Rightarrow x = \sqrt{y} - \frac{1}{4} & \Rightarrow g(x) = \sqrt{y} - \frac{1}{4} \end{cases}$$

Calcul du volume :

$$\begin{aligned} V &= \pi \left[ \int_0^4 f^2(y) dy - \int_{1/16}^4 g^2(y) dy \right] = \pi \left[ \int_0^4 y dy - \int_{1/16}^4 \left( \sqrt{y} - \frac{1}{4} \right)^2 dy \right] \\ &= \pi \left[ \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^4 - \left[ \frac{y^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} + \frac{1}{16} y \right]_{1/16}^4 \right] = \dots = \boxed{\frac{3713\pi}{1536} \approx 24.774 \text{ u}^3} \end{aligned}$$

---

27 octobre 2013

# EXANA368 – FACS, ULB, Bruxelles, juillet 2013.

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{\ln|x| + \frac{1}{2}}{x^2}$  pour tout  $x$  réel non nul.

- $f$  est-elle paire ou impaire? Justifier.
- Déterminer les éventuels zéros de  $f$ .
- Que vaut la limite de  $f$ 
  - lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ ? Justifier.
  - lorsque  $x$  tend vers 0 par valeurs  $> 0$ ? Justifier.
- Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
- Combien le graphe de  $f$  possède-t-il de points de maximum? de minimum? Justifier.
- Trouver les éventuels points d'inflexion du graphe de  $f$  et calculer leurs abscisse.
- Esquisser le graphe de  $f$ , en indiquant les différents points qui apparaissent dans vos réponses aux questions précédentes.

a) Fonction paires :  $f(-x) = \frac{\ln|-x| + 1/2}{(-x)^2} = f(x)$

b)  $\text{Dom } f = \mathbb{R}_0$

Racines :  $\ln x + 1/2 = 0 \Rightarrow x = e^{-1/2}$  et donc aussi  $x = -e^{-1/2}$  en vertu de a)

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 1/2}{x^2} = 0$  Car toute puissance de  $x$  l'emporte sur  $\ln$ .

On peut aussi appliquer l'Hospital.  $\Rightarrow AH \equiv y = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x + 1/2}{x^2} = -\frac{\infty}{0} = -\infty \Rightarrow AV \equiv x = 0$


d)  $f'(x) = -2 \frac{\ln|x|}{x^3} \Rightarrow$

	-1	0	+1
$f'$	+	0	-
$f$	↗	↘	↗
	$M_2\left(-1, \frac{1}{2}\right)$	$M_1\left(1, \frac{1}{2}\right)$	

e) La fonction possède deux maximum. Voir tableau de  $f'$

f)  $f''(x) = \frac{6\ln|x| - 2}{x^4} \Rightarrow$

	$-e^{-1/3}$	0	$+e^{-1/3}$
$f''$	+	-	+
$f$	∪	∩	∪
	$I_2\left(-e^{-1/3}, \frac{5e^{-2/3}}{6}\right)$	$I_1\left(e^{-1/3}, \frac{5e^{-2/3}}{6}\right)$	



9 septembre 2013

# EXANA369 – FACS, ULB, Bruxelles, juillet 2013

Calculer (en justifiant les calculs)

$$a) \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}} \frac{5 + \sin(7x)}{1 + 9x^2} dx$$

$$b) \int \frac{x^2 - 5x + 7}{e^{3x}} dx$$

---

$$\begin{aligned} 1) I &= \int_{-1/3}^{1/3} \frac{5 + \sin(7x)}{1 + 9x^2} dx = \int_{-1/3}^{1/3} \frac{5}{1 + 9x^2} dx + \underbrace{\int_{-1/3}^{1/3} \frac{\sin(7x)}{1 + 9x^2} dx}_{=0 \text{ car fonction impaire}} = \frac{5}{3} \int_{-1/3}^{1/3} \frac{1}{1 + (3x)^2} d(3x) \\ &= \frac{5}{3} [\arctan(3x)]_{-1/3}^{1/3} = \frac{5}{3} \pi (\arctan(1) - \arctan(-1)) = \frac{5}{3} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{5\pi}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) I &= \int e^{-3x} (x^2 - 5x + 7) dx & f &= x^2 - 5x + 7 & f' &= 2x - 5 \\ & & g' &= e^{-3x} & g &= -\frac{1}{3} e^{-3x} \\ \Rightarrow I &= -\frac{1}{3} e^{-3x} (x^2 - 5x + 7) + \frac{1}{3} \int \underbrace{e^{-3x} (2x - 5)}_{=I'} dx \\ & & f &= 2x - 5 & f' &= 2 \\ I' &= \int e^{-3x} (2x - 5) dx & g' &= e^{-3x} & g &= -\frac{1}{3} e^{-3x} \\ \Rightarrow I' &= -\frac{1}{3} e^{-3x} (2x - 5) + \frac{2}{3} \int \underbrace{e^{-3x}}_{=-\frac{1}{3} e^{-3x}} dx \\ \Rightarrow I &= -\frac{1}{3} e^{-3x} (x^2 - 5x + 7) + \frac{1}{3} \left( -\frac{1}{3} e^{-3x} (2x - 5) - \frac{2}{9} e^{-3x} \right) = -\frac{e^{-3x}}{27} (9x^2 - 39x + 50) + C \end{aligned}$$

---

20 février 2014