

Exercices résolus de mathématiques.

Algèbre

ALG 62

EXALG620 – EXALG629

<http://matheux.ovh/Accueil.html>

Jacques Collot
Jan Frans Broeckx – Nicole Berckmans
Fabienne Zoetard

Mars 2020

EXALG620 – Polytech, UMons, Mons, 2015.

Soit $P(x)$, le polynôme $ax^2 + bx - 4$. Le reste de la division de ce polynôme par $(x - 1)$ vaut 12. Sachant que ce polynôme est divisible par $(x + 2)$, calculez a , b et les racines de $P(x)$.

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

Puisque le reste de la division de $P(x)$ par $(x - 1)$ vaut 12, on peut écrire :

$$P(x) = (x - 1)Q(x) + 12 \quad (1)$$

$$P(1) = 12 \quad (2)$$

$$a + b - 4 = 12 \quad (3)$$

$$a + b = 16 \quad (4)$$

$P(x)$ étant divisible par $(x + 2)$, on a :

$$P(-2) = 0 \quad (5)$$

$$4a - 2b - 4 = 0 \quad (6)$$

$$2a - b = 2 \quad (7)$$

En additionnant (4) et (7), on obtient :

$$3a = 18$$

$$a = 6$$

On déduit alors que $b = 10$.

La première racine $x = -2$ est donnée dans l'énoncé. La division du polynôme $P(x)$ par $(x + 2)$ donne $(6x - 2)$. La seconde racine est donc $x = \frac{1}{3}$.

EXALG621 – Polytech, UMon, Mons, 2016.

Déterminez les deux côtés (x, y) de l'angle droit d'un triangle rectangle dont on connaît le périmètre $2p$ et l'aire a^2 .

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

Le périmètre (en utilisant Pythagore) et l'aire d'un triangle rectangle s'expriment par :

$$x + y + \sqrt{x^2 + y^2} = 2p \quad (9)$$

$$\frac{xy}{2} = a^2 \quad (10)$$

Le développement de (1), en utilisant l'équation (2), donne :

$$x^2 + y^2 = (2p - x - y)^2 \quad (11)$$

$$= 4p^2 - 4px - 4py + 2xy + x^2 + y^2 \quad (12)$$

$$= 4p^2 - 4px - 4py + 4a^2 + x^2 + y^2 \quad (13)$$

ce qui mène à :

$$4p^2 - 4px - 4py + 4a^2 = 0 \quad (14)$$

$$x + y = \frac{a^2 + p^2}{p} \quad (15)$$

On peut résoudre le système d'équations de 2 manières.

Méthode 1

Les équations (2) et (7) correspondent au produit \mathcal{P} et à la somme \mathcal{S} des 2 cotés x et y

$$\mathcal{S} = x + y = \frac{a^2 + p^2}{p} \quad (16)$$

$$\mathcal{P} = xy = 2a^2 \quad (17)$$

On en déduit que x et y sont les solutions de l'équation

$$r^2 - \mathcal{S}r + \mathcal{P} = 0 \quad (18)$$

Il vient donc :

$$\rightarrow x, y = r_{1,2} = \frac{\frac{a^2 + p^2}{p} \pm \sqrt{\left(\frac{a^2 + p^2}{p}\right)^2 - 8a^2}}{2} \quad (19)$$

Méthode 2

En injectant (2) dans (7), on obtient une équation en x :

$$x + \frac{2a^2}{x} = \frac{a^2 + p^2}{p} \quad (20)$$

$$x^2 - \frac{a^2 + p^2}{p}x + 2a^2 = 0 \quad (x \neq 0) \quad (21)$$

On en déduit deux valeurs possibles pour x :

$$\rightarrow x_{1,2} = \frac{\frac{a^2+p^2}{p} \pm \sqrt{\left(\frac{a^2+p^2}{p}\right)^2 - 8a^2}}{2} \quad (22)$$

En utilisant (7), on obtient les 2 valeurs de y correspondantes :

$$\rightarrow y_{1,2} = \frac{a^2 + p^2}{p} - x_{1,2} = \frac{\frac{a^2+p^2}{p} \mp \sqrt{\left(\frac{a^2+p^2}{p}\right)^2 - 8a^2}}{2} = x_{2,1} \quad (23)$$

On observe que les deux couples de solution $(x_1, y_1) [= (x_1, x_2)]$ et $(x_2, y_2) [= (x_2, x_1)]$ sont identiques. La valeur des côtés x et y correspondent donc aux expressions x_1 et x_2 donnés par (14).

Discussion et commentaires

a) Il existe une solution au problème si

$$\left(\frac{a^2 + p^2}{p}\right)^2 \geq 8a^2 \quad (24)$$

On vérifie également que les valeurs obtenues pour les longueurs x et y sont bien positives.

b) On observe que $x=y$ (triangle rectangle isocèle) si

$$\left(\frac{a^2 + p^2}{p}\right)^2 = 8a^2 \quad (25)$$

c) On peut vérifier l'exactitude des équations (11) et (14) avec, par exemple, $x = 3$ et $y = 4$.

→ Dans ce cas, $z = 5$, $2p = 3 + 4 + 5 = 12$ et $a^2 = 3.4/2 = 6$.

EXALG622 – Polytech, UMons, Mons, 2016.

En fonction du paramètre a , résoudre l'inéquation suivante

$$\frac{\sqrt{x^3(x-1)}}{x} \leq a$$

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

Les conditions d'existence sont les suivantes : $x^3(x-1) \geq 0$ et $x \neq 0$.

	0	1
x^3	- 0 +	+ +
$x - 1$	- - -	0 -
$x^3(x-1)$	+ 0 -	0 +

Ce qui donne finalement : $x < 0$ ou $x \geq 1$.

Cas $x < 0$

Comme $\frac{\sqrt{x^3(x-1)}}{x} < 0$, l'inéquation est toujours vérifiée si $a \geq 0$.

Si $a < 0$, nous avons que $-\frac{\sqrt{x^3(x-1)}}{x} \geq -a$ avec les deux termes de l'inéquation strictement positifs. En élevant ces termes au carré, nous obtenons la condition suivante : $x^2 - x - a^2 \geq 0$.

Ce qui implique : $x \leq \frac{1-\sqrt{1+4a^2}}{2}$ ou $x \geq \frac{1+\sqrt{1+4a^2}}{2}$

Comme $x < 0$, nous avons que $x \in]-\infty, \frac{1-\sqrt{1+4a^2}}{2}]$.

Cas $x \geq 1$

Comme $\frac{\sqrt{x^3(x-1)}}{x} \geq 0$, l'inéquation n'est jamais vérifiée si $a < 0$.

Si $a \geq 0$, nous avons que $\frac{\sqrt{x^3(x-1)}}{x} \leq a$ avec les deux termes de l'inéquation positifs. En élevant ces termes au carré, nous obtenons la condition suivante : $x^2 - x - a^2 \leq 0$.

Ce qui implique : $\frac{1-\sqrt{1+4a^2}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{1+4a^2}}{2}$

Comme $x \geq 1$, nous avons que $x \in [1, \frac{1+\sqrt{1+4a^2}}{2}]$.

En conclusion :

$$a \geq 0 \Rightarrow x \in]-\infty, 0[\cup [1, \frac{1+\sqrt{1+4a^2}}{2}]$$

$$a < 0 \Rightarrow x \in]-\infty, \frac{1-\sqrt{1+4a^2}}{2}]$$

EXALG623 – Polytech, UMons, Mons, 2016.

Soit une usine d'embouteillage d'eau plate et d'eau gazeuse, où 84 palettes de bouteilles d'eau d'un litre sont produites par jour. L'usine dispose de deux chaînes d'embouteillage, une pour l'eau plate (chaîne 1) et l'autre pour l'eau gazeuse (chaîne 2).

Les vitesses de production des deux chaînes sont différentes mais constantes au cours du temps et ces dernières fonctionnent durant le même laps de temps.

On vous demande de déterminer le nombre de palettes d'eau plate et d'eau gazeuse sortantes sachant que si les chaînes d'embouteillage étaient « inversées », il faudrait $\frac{1}{3}$ de temps en plus pour embouteiller l'eau gazeuse et $\frac{1}{4}$ de temps en moins pour embouteiller l'eau plate.

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

Soient :

- n_A : le nombre de palettes d'eau plate produites par jour
- n_B : le nombre de palettes d'eau gazeuse produites par jour
- v_1 : la vitesse d'embouteillage de la chaîne 1
- v_2 : la vitesse d'embouteillage de la chaîne 2

On a :

$$n_A + n_B = 84 \quad (1)$$

On peut écrire :

$$\frac{n_A}{v_2} = \frac{3}{4}t \quad (2)$$

$$\frac{n_B}{v_1} = \frac{4}{3}t \quad (3)$$

De plus, les temps de fonctionnement t sont égaux :

$$t = \frac{n_A}{v_1} = \frac{n_B}{v_2} \quad (4)$$

De (1), on tire :

$$n_B = 84 - n_A \quad (5)$$

En remplaçant (5) dans (4), on a :

$$\frac{n_A}{v_1} = \frac{84 - n_A}{v_2} \quad (6)$$

On remplace v_1 et v_2 par leur expression dans (6) :

$$\frac{n_A}{\frac{(84-n_A)}{\frac{4}{3}t}} = \frac{(84 - n_A)}{\frac{(n_A)}{\frac{3}{4}t}} \quad (7)$$

Comme $n_A > 0$, une seule racine est possible :

$$\begin{aligned} n_A &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{(-2 \times 9 \times 84) + (24 \times 84)}{14} \\ &= 36 \end{aligned}$$

- $n_A = 36$ palettes d'eau plate embouteillées par jour
- $n_B = 48$ palettes d'eau gazeuse embouteillées par jour

EXALG624 – Polytech, UMons, Mons, 2016.

Résoudre l'inéquation suivante :

$$\frac{x^2}{(x+1-\sqrt{x+1})^2} < \frac{x^2+3x+18}{(x+1)^2}$$

Suggestion : dans la résolution, poser $y = \sqrt{x+1}$

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

Conditions d'existence :

- $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$
- $x + 1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$
- $x + 1 - \sqrt{x+1} \neq 0 \Leftrightarrow x^2 + x \neq 0 \rightarrow x \neq 0$ et $x \neq -1$

On a donc : $x \in]-1, 0[\cup]0, \infty[$

Posons $y = \sqrt{x+1}$. Nous déduisons $x = y^2 - 1$ et l'inéquation s'écrit :

$$\frac{(y^2 - 1)^2}{(y^2 - y)^2} < \frac{(y^2 - 1)^2 + 3(y^2 - 1) + 18}{y^4}$$

avec $y \in]0, 1[\cup]1, \infty[$

$$\begin{aligned} \frac{(y+1)^2}{y^2} &< \frac{y^4 + y^2 + 16}{y^4} \\ (y+1)^2 y^2 &< y^4 + y^2 + 16 \\ 2y^3 &< 16 \end{aligned}$$

Vu le domaine de y , $2y^3 < 16$ est satisfaite avec $y < 2$. Autrement dit, on a :

$y \in]0, 1[\cup]1, 2[$ et $x \in]-1, 0[\cup]0, 3[$.

Le 1/03/2020

EXALG625 – Polytech, UMons, Mons, 2016.

Résoudre l'équation suivante :

$$|x+1| - |x| + 3|x-1| - 2|x-2| = x+2$$

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

5 cas sont à considérer :

Cas 1 : $x \leq -1$

$$\begin{aligned} f(x) &= -(x+1) + x - 3(x-1) + 2(x-2) - (x+2) \\ &= -2x - 4 \end{aligned}$$

La racine est $x = -2$ qui répond à la condition $x \leq -1$

Cas 2 : $-1 \leq x \leq 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1) + x - 3(x-1) + 2(x-2) - (x+2) \\ &= -2 \end{aligned}$$

Il n'y a pas de solution.

Cas 3 : $0 \leq x \leq 1$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1) - x - 3(x-1) + 2(x-2) - (x+2) \\ &= -2x - 2 \end{aligned}$$

La racine est $x = -1$ qui ne peut être acceptée étant donné la condition $0 \leq x \leq 1$.

Cas 4 : $1 \leq x \leq 2$


$$\begin{aligned} f(x) &= (x + 1) - x + 3(x - 1) + 2(x - 2) - (x + 2) \\ &= 4x - 8 \end{aligned}$$

La racine est $x = 2$ qui répond à la condition $1 \leq x \leq 2$.

Cas 5 : $x \geq 2$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x + 1) - x + 3(x - 1) - 2(x - 2) - (x + 2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

L'équation admet une infinité de solutions pour $x \geq 2$.



Le 1/03/2020

EXALG626 - Polytech, UMons, Mons, 2017, juillet.

Sans calculer le déterminant, identifier $a \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{vmatrix} 2 & 9 & 5 \\ 3 & a(a-1) & 6 \\ 4 & 15 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

Si le déterminant est nul, c'est que l'une de ses colonnes peut s'exprimer à partir des autres. Par exemple, on peut considérer que la colonne 2 s'exprime comme la somme pondérée des colonnes 1 et 3. On a donc que

$$\begin{aligned} 2.x + 5.y &= 9 \\ 3.x + 6.y &= a(a-1) \\ 4.x + 7.y &= 15 \end{aligned}$$

Si on somme les lignes 1 et 3, on obtient

$$6.x + 12.y = 24 \quad \iff \quad 3.x + 6.y = 12$$

En comparant avec la ligne 2, on peut donc dire que $a(a-1) = 12$. En résolvant l'équation du second degré en a , on obtient $a = -3$ ou $a = 4$.

Le 1/03/2020

EXALG627- Polytech, UMons, Mons, 2017, juillet.

Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation suivante

$$\log_{1/2} \left(2x - 13 + \frac{15}{x} \right) < 1 + \log_{1/2} (2(x-15))$$

Nous reprenons la solution proposée par l'université

https://web.umons.ac.be/app/uploads/sites/6/2020/02/AlgebreAnalyse_2014-2017_siteweb_2020.pdf

Les conditions d'existence sont

1. pour le membre de gauche, $2x - 13 + \frac{15}{x} > 0$, autrement dit $(x-5)(x-\frac{3}{2}) > 0$, donc $x < \frac{3}{2}$ ou $x > 5$,
2. pour le membre de droite, $x > 15$,

L'intersection de ces conditions donne $x > 15$.

L'inégalité peut s'écrire

$$\log_{1/2} \left(2x - 13 + \frac{15}{x} \right) < \log_{1/2} \left(\frac{1}{2} \right) + \log_{1/2} (2(x-15)),$$

ou encore

$$\log_{1/2} \left(2x - 13 + \frac{15}{x} \right) < \log_{1/2} \left(\frac{1}{2} 2(x-15) \right).$$

Puisque $\log_{1/2} a = \frac{\ln a}{\ln \frac{1}{2}}$, et que $\ln(1/2) < 0$, cela équivaut à

$$\ln \left(2x - 13 + \frac{15}{x} \right) > \ln(x-15).$$

On en déduit que

$$2x - 13 + \frac{15}{x} > x - 15$$

ce qui implique $x^2 + 2x + 15 > 0$, qui est toujours vérifié.

Au final on trouve donc $x \in]15, +\infty[$.

Le 1/03/2020

EXALG628 – EPL, UCL, LLN, juillet 2020.

Mode restreint.

A l'occasion de la naissance de son fils Laurent, Bruno plante cinq jeunes arbres dans une grande prairie, à équidistance sur le pourtour d'un cercle de rayon $R_0 = 10$ m.

Chaque année, les graines des arbres situés sur le cercle extérieur produisent de nouvelles pousses d'arbre sur un nouveau cercle. Ce nouveau cercle est concentrique au précédent, et son rayon est augmenté de R_0 , c'est-à-dire que le second cercle a un rayon de 20 m, le troisième de 30 m, et ainsi de suite. Par une bizarrerie de la nature, le nombre de nouvelles pousses est tel que la distance entre les arbres situés sur un cercle reste identique quel que soit le cercle.

Au bout d'un certain nombre d'années, Bruno revient avec Laurent. Ils dénombrent une forêt de 1050 arbres et ils constatent par ailleurs que tous les arbres sont en bonne santé.

Note 1 : mettez ce problème en équation(s), justifiez vos réponses et arrondissez à l'unité la plus proche de vos réponses finales.

Note 2 : expliquez soigneusement votre raisonnement.

Question 1. Quel est l'âge de Laurent?

Pour accéder au centre de la forêt, où ils souhaitent construire une cabane, Laurent et Bruno décident d'ouvrir un sentier en abattant un arbre par cercle.

Question 2. Supposant que le volume V_0 d'un arbre est 0.04 m^3 la première année et que ce volume double chaque année, quel sera le volume total de bois à évacuer de la prairie pour ouvrir ce sentier? Veuillez fournir le résultat de manière formelle (c'est-à-dire sous une forme algébrique la plus simple possible) puis de manière numérique.

Solution proposée par Emilie Jacqmin

1)



Si on note u_n le nombre d'arbres se trouvant sur le $n^{\text{ième}}$ cercle, alors les termes u_n ($n \in N_0$) forment une suite arithmétique de premier terme $u_1 = 5$ et de raison $r = 5$.

On cherche n tel que :

$$\begin{aligned} S_n = 1050 &\Leftrightarrow \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = 1050 \Leftrightarrow \frac{n(5 + 5 + (n-1) \cdot 5)}{2} = 1050 \Leftrightarrow n(10 + 5(n-1)) = 2100 \\ &\Leftrightarrow n(2 + n - 1) = 420 \Leftrightarrow n^2 + n - 420 = 0 \Leftrightarrow n = -21 \text{ ou } n = 20 \end{aligned}$$

On peut en déduire que Laurent a 19 ans.

2)


Si on note v_n le volume d'un arbre situé sur le $n^{\text{ième}}$ cercle, alors les termes v_n ($n \in N_0$) forment une suite géométrique de premier terme $v_1 = V_0 = 0,04$ et de raison $q = 2$.

Le volume total de bois à évacuer correspond à :

$$S_{20} = 0,04 \cdot \frac{1 - 2^{20}}{1 - 2} = 0,04 \cdot (2^{20} - 1) \Rightarrow \boxed{S_{20} = V_0 \cdot (2^{20} - 1) m^3}$$

$$\text{Donc, } S_{20} = 0,04 \cdot (2^{10} - 1)(2^{10} + 1) = \frac{1}{25} \cdot 1023 \cdot 1025 = 1023 \cdot 41 \Rightarrow \boxed{S_{20} = 41943 m^3}$$

Solution proposée par Nicole Berckmans et Martine Devillers



1) Calculons les arcs :

$$\text{Age 0} \quad A_1B_1 = \frac{2\pi \times 10}{5} = 4\pi \quad ; \quad n_1 = 5$$

$$\text{Age 1} \quad A_2B_2 = \frac{2\pi \times 20}{n_2} = 4\pi \quad ; \quad n_2 = 20$$

$$\text{Age 2} \quad A_3B_3 = \frac{2\pi \times 30}{n_3} = 4\pi \quad ; \quad n_3 = 15$$

$$\text{Age } n-1 \quad A_nB_n = \frac{2\pi \times 30}{n_n} = 4\pi \quad ; \quad n_n = 5n$$

$$\text{Nombre total d'arbres à la } n^{\text{ème}} \text{ année : } 1050 = \frac{5+5n}{2}n \Rightarrow n^2 + n - 420 = 0 \Rightarrow n = 20$$

Laurent à 19 ans.

2) Volume à retirer

$$1^{\text{er}} \text{ arbre} \quad 0.04 \text{ m}^3$$

$$2^{\text{ème}} \text{ arbre} \quad 2 \times 0.04 \text{ m}^3$$

$$3^{\text{ème}} \text{ arbre} \quad 2^2 \times 0.04 \text{ m}^3$$

$$20^{\text{ème}} \text{ arbre} \quad 2^{19} \times 0.04$$

C'est donc une suite géométrique de premier terme 0.04 et de raison 2.

$$\text{Volume total : } 0.04(1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{18}) = 0.04 \frac{1-2^{20}}{1-2} = 41943 \text{ m}^3$$

Le 1/09/2020

EXALG629 - EPL, UCL, LLN, juillet 2020.

Mode restreint.

Cette question comporte 4 sous-questions pour lesquelles seule la réponse finale soit être reprise dans le cadre correspondant. Ne fournissez donc aucune justification à vos réponses pour cette question.

Question 1

Déterminez le quotient et le reste de la division du polynôme $3z^5 + 5z^3 + z^2 + 2$ par $z^3 + 3$.

Question 2

Déterminez la valeur du paramètre réel m de sorte que les solutions de l'équation réelle suivante soient l'inverse l'une de l'autre :

$$3x^2 + 2x + m = 0$$

Question 3

Déterminez les conditions d'existence de l'équation rationnelle suivante :

$$\sqrt{\frac{x}{1-x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$$

Question 4

Déterminez dans \mathbb{R} les solutions de l'équation suivante :

$$x^2 - 2x + 1 = |1 - x|$$

Solution proposée par Emilie Jacqmin

1)

$$\begin{array}{r|l} 3z^5 + 5z^3 + z^2 + 2 & z^3 + 3 \\ - (3z^5 + 9z^2) & 3z^2 + 5 \\ \hline 5z^3 - 8z^2 + 2 & \\ - (5z^3 + 15) & \\ \hline -8z^2 - 13 & \end{array}$$

$$\boxed{\text{Quotient} = 3z^2 + 5}$$

$$\boxed{\text{Reste} = -8z^2 - 13}$$

2) Il faut :

- $\rho \geq 0 \Leftrightarrow 4 - 12m \geq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{3}$
- $x_1 = \frac{1}{x_2} \Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 = 1 \Leftrightarrow \frac{m}{3} = 1 \Leftrightarrow m = 3$.

C'est donc **impossible**.

3) Il faut :

- $1 - x^2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$
- $\frac{x}{1 - x^2} \geq 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ ou } 0 \leq x < 1$
- $1 + x > 0 \Leftrightarrow x > -1$

Conclusion : $S_{CE} = [0; 1[$

4)

Algébriquement :

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 1 = |1 - x| &\Leftrightarrow (x - 1)^2 = |1 - x| \Leftrightarrow (x - 1)^4 = (x - 1)^2 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \text{ ou } (x - 1)^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x - 1 = \pm 1 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = 2 \text{ ou } x = 0 \end{aligned}$$

Conclusion : $S = \{0; 1; 2\}$

Graphiquement :



Solution proposée par Nicole Berckmans et Martine Devillers

1) Quotient et reste de la division.

$$\begin{array}{r|l}
 3z^5 + 5z^3 + 2z^2 + 2 & z^3 + 3 \\
 \underline{3z^3} & \\
 +5z^3 - 7z^2 + 2 & 3z^2 + 5 \\
 \underline{+5z^3} & \\
 & -7z^2 - 13
 \end{array}
 \Rightarrow \text{Quotient : } 3z^2 + 5; \text{ Reste : } -7z^2 - 13$$

D'autres méthodes existent pour résoudre ce problème.

$$2) 3x^2 + 2x + m = 0 \quad P = x_1 \cdot \frac{1}{x_1} = 1 = \frac{m}{3} \Rightarrow m = 3$$

$$\text{Or } \Delta = 4 - 12m > 0 \Rightarrow m \leq \frac{1}{3} \quad \text{Conclusion : impossible.}$$

$$3) \sqrt{\frac{x}{1-x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$$

$$\text{CE : } \begin{cases} x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq 1 \text{ et } x \neq -1 \\ 1+x > 0 \Rightarrow x > -1 \\ x \geq 0 \text{ car une racine carrée est toujours positive.} \end{cases} \Rightarrow \text{Conclusion : } x \in [0, 1[$$

$$\frac{x}{1-x^2} \geq \frac{x}{1-x^2} \quad \begin{array}{c|ccc} & -1 & 0 & 1 \\ \hline & + & / & - \\ & - & 0 & + \\ & + & / & - \end{array}$$

$$4) x^2 - 2x + 1 = |1-x| \Rightarrow (x-1)^2 = |x-1|$$

$$\text{Si } 1 \leq x \Rightarrow (x-1)^2 = x-1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{Si } x \leq 1 \Rightarrow (x-1)^2 = 1-x \Rightarrow x_3 = 0$$

$$\text{Conclusion : } S = \{0, 1, 2\}$$

Le 1/09/2020